

Hướng dẫn kỹ thuật



Hướng dương cắt cành F₁ – MS: FHLS151: Ziggy

Thời gian cây con: 3 – 4 tuần

Ra hoa từ ngày sang chậu: 6 – 7 tuần

Thông tin chung

| Ánh nắng | Điều kiện gieo trồng | Chiều cao cây | Tán cây | Khoảng cách |
|------------|----------------------|---------------|---------|-------------|
| Nắng nhiều | Quanh năm | 130 – 150 cm | - | - |

Nảy mầm

| Dạng hạt | Kích cỡ khay gieo (số lỗ) | Số hạt/lỗ | Thời gian cây con (tuần) | Ngày nảy mầm | Số đo pH/EC | Phủ hạt |
|----------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Hạt thô | Trực tiếp vào luống | 1 – 2 | 3 – 4 | 4 – 6 | 5.5 – 6.2 pH 0.75 mmhos/cm | Lớp mỏng |

Giai đoạn cây con

| | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 | Giai đoạn 4 |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--|--|
| Độ ẩm giá thể | Ướt | Ám – ướt | Hơi ẩm – ướt | Hơi ẩm – ướt |
| Nhiệt độ | 18 – 20°C | 20°C | 17°C | 17°C |
| Ánh sáng | Tùy chọn | 100 – 1,000 Lux | 1,500 – 2,500 f.c. | 2,500 – 5,000 f.c. |
| Phân bón | | 0.075 – 0.1g đậm/lít nước <0.7 EC | 0.1 – 0.15g đậm/lít nước 1.0 – 1.2 EC | 0.1 – 0.15g đậm/lít nước 1.0 – 1.2 EC |

Những lưu ý trong giai đoạn cây con

Sang chậu đúng ngày để tránh tình trạng cây con bị vươn dài.

Giai đoạn trồng

| Nhiệt độ gieo trồng | pH/EC | Phân bón | Thời gian chiếu sáng |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
| (ngày) 22°C | 5.5 – 6.2 pH | 0.2 – 0.25g đậm/lít nước | Không bị ảnh hưởng bởi thời gian chiếu sáng |
| (đêm) 20°C | 1.75 – 3.0 mmhos/cm | 1.0 – 1.2 EC | |

Những lưu ý khi trồng

Không được để cây bị khô, sẽ dẫn đến hiện tượng cháy lá. Tưới nước vào buổi chiều có thể dẫn đến các bệnh liên quan đến lá.

Trước khi gieo hạt, xử lý giá thể bằng cách phun thuốc diệt cỏ. Hướng dương sẽ phát triển kém khi phải cạnh tranh với cỏ dại.

Hướng dương không thể chịu lạnh, vì vậy không trồng cây ở điều kiện nhiệt độ <12°C.

Tránh để nồng độ đạm trong đất lên quá cao. Khi nhiệt độ <10°C, cây có thể bị thiếu sắt & thiếu lân. Bón phân dùng công thức gốc lân cân bằng.

Tránh sử dụng phân bón gốc ammonium hoặc có hàm lượng đạm cao. Bổ sung thêm ma-giê sun-fát 0.05% để tránh bị thiếu hụt ma-giê. Nếu thiếu sắt, bổ sung bằng cách thêm chelate sắt.

Trồng cây sát nhau & không bón quá nhiều phân (nếu các lá gần gốc bắt đầu chuyển vàng, thêm phân bón hòa tan để giữ lá xanh). Dư phân bón sẽ khiến cây quá cao để làm hoa cắt cành.

Các vấn đề thường gặp

Bệnh: nấm Botrytis, bệnh mốc sương

Côn trùng: bọ trĩ, rệp vừng, sâu cuốn lá

Ghi chú

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.

Hình ảnh



WWW.FLORALSEEDVN.COM